

Пример оформления рисунка:




Рис 1. Распределение пациенток в зависимости от распространенности перитонеального экссудата в брюшной полости

Fig. 1. Distribution of patients depending on the prevalence of peritoneal exudate in the abdominal cavity

Пример оформления таблицы:

Таблица/Table 1.

Этиология перитонита гинекологического генеза

Etiology of peritonitis of gynecological genesis

Причина перитонита Cause of peritonitis	Количество случаев Number of cases	
	абс abs	%
Гнойный сальпингит Purulent salpingitis	13	29,5%
Гнойные tuboовариальные образования Purulent tubo-ovarian formations	5	11,4%

Пиосальпинкс Pyosalpinx	10	22,7%
Пиовар Pyovar	3	6,8%
Прорыв абсцесса маточной трубы (пиосальпинкса) Rupture of fallopian tube abscess (pyosalpinx)	6	13,6%
Прорыв тубо-яичникового абсцесса Rupture of tubo-ovarian abscess	3	6,8%
Прорыв абсцесса яичника (пиовара) Rupture of ovarian abscess (pyovara)	2	4,5%
Разрыв нагноившейся дермоидной кисты яичника Rupture of a suppurating ovarian dermoid cyst	2	4,5%
p	df=8; $\chi^2=23,688$; p<0,01	

Пример оформления примечания под таблицы:

Примечание: АГ — артериальная гипертензия; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ССА — синдром старческой астении; САД ао — систолическое артериальное давление в аорте; ДАД ао — диастолическое артериальное давление в аорте; ПАД ао — пульсовое артериальное давление в аорте; АИх ао — индекс аугментации в аорте; РРА — амплификация пульсового давления; ED — длительность периода изгнания из левого желудочка; SEVR — индекс эффективности субэндокардиального кровотока. Представлены результаты оценки влияния хронической сердечной недостаточности и синдрома старческой астении на показатели центрального аортального давления у пациентов, включённых в исследование: ↑ — статистически значимо «больше»; ↓ — статистически значимо «меньше»; ↔ — различия статистически незначимы.

Note: AH — arterial hypertension; CHF — chronic heart failure; SSA — senile asthenia syndrome; SBP ao — systolic blood pressure in the aorta; DBP ao — diastolic blood pressure in the aorta; PBP ao — pulse blood pressure in the aorta; AIx ao — augmentation index in the aorta; PPA — pulse pressure amplification; ED — ejection duration from the left ventricle; SEVR — subendocardial viability ratio. The results of assessing the effect of chronic heart failure and senile asthenia

syndrome on central aortic pressure in patients included in the study are presented: ↑ — statistically significant “more”; ↓ — statistically significant “less”; ↔ — differences are statistically insignificant